SEITE 1

PFLANZENART BOTANISCHER NAME DEUTSCHE BEZEICHNUNG	MAX. HÖHE IN M	WÜCHSIGKEIT			KLETTERFORM					KLETTERHILFE								FÜHRUNG DER KLETTERHILFE	STANDORT						BODEN			HAUPTBLÜTEZEIT (MONATE)	BLÜTENFARBEN	BESONDERHEITEN					NUTZWERT			ANMERKUNGEN
		STARK	MITTEL	SCHWACH	HAFTWURZELN	HAFTSCHEIBEN	RANKEN	SCHLINGPFLANZE	SPREIZKLIMMER	DÜNNE HOLZLATTEN, SPALIER	DRAHTGEFLECHT, ZAUN	SPANNDRÄHTE	STABILES HOLZLATTENGERÜST	METALLGITTER	PERGOLA, (BALKON-)STÜTZEN	KEINE HILFE NOTWENDIG	UNTERSTÜTZUNG SINNVOLL		○ SONNIG (S,SW,W)	◐ HALBSCHATTIG (O,SO,NW)	● SCHATTIG (N,NO)	GESCHÜTZTER STANDORT NOTWENDIG	WURZELANSATZ SCHATTIG HALTEN	EMPFINDLICH GEGEN TROCKENHEIT	SAUER (TORFBEIMISCHUNG)	NEUTRAL (NORMALER BODEN)	ALKALISCH (KOMPOSTBEIMISCHUNG)			IMMERGRÜN	AUFFÄLLIGE HERBSTFÄRBUNG	AUFFÄLLIGE BLÜTE	BLÜTENDUFT	AUFFÄLLIGE FRÜCHTE	FRÜCHTE GENIESSBAR	VOGELSCHUTZGEHÖLZ	BIENENNÄHRPFLANZE	PFLANZE AUCH HERABHÄNGEND	
ACTINIDIA ARGUTA KLEINE KIWI	5-6	x						x				x	x		x			II	x					x		x		4.-7.	GRÜNLICH WEISS				x		x		x		ZWEIHÄUSIG, D.H. ZUR FRUCHTBILDUNG WERDEN MÄNNLICHE UND WEIBLICHE PFLANZE BENÖTIGT. FRÜCHTEN NUR IN GESCHÜTZTEN, WARMEN LAGEN.
ACTINIDIA CHINENSIS CHINESISCHER STRAHLENGRIFFEL	8	x						x				x	x		x				x					x	x			5.-6.	WEISS						x		x		
ACTINIDIA KOLOMIKTA KOLOMIKTAWEIN	3-4			x				x			x	x	x		x				x					x		x		5.-7.	WEISS				x		x		x		
ACTINIDIA POLYGAMA SILBERWEIN	4	x						x				x	x		x				x					x		x		6.-7.	WEISS				x				x		
AKEBIA QUINATA AKEBIE, KLETTERGURKE	4-6		x					x				x	x		x			II	x	x						x		4.-5.	BRAUN-PURPUR			x	x	x	x	x	x		FRÜCHTEN NUR IN WARMEN LAGEN
AKEBIA TRIFOLIATA DREIBLÄTTRIGE AKEBIE	3-4			x				x				x	x		x				x	x						x		3.-6.	BRAUN-PURPUR			x	x	x	x	x	x		
AMPELOPSIS ACONITIFOLIA DOLDENREBE	4		x				x			x		x	x	x				#	x	x							x	7.-8.	BLASSGRÜN					x		x			
AMPELOPSIS BREVIPEDUNCULATA USSURIREBE	6		x				x			x		x	x	x					x	x							x	6.	GRÜN					x		x			
ARISTOLOCHIA MACROPHYLLA PFEIFENWINDE	8-10	x						x				x	x		x			II	(x)	x						x		5.-6.	GELBGRÜN										BLÜTEN HABEN PFEIFENFORM, SIND UNTER DEN GROSSEN BLÄTTERN (BIS 30 CM ⌀) VERSTECKT. SEHR STARK SCHLINGEND. IN SONNIGEN LAGEN BODENFEUCHTE ERFORDERLICH.
ARISTOLOCHIA TOMENTOSA FILZIGE OSTERLUZEI	5-7		x					x				x	x		x				(x)	x						x		6.-7.	GELBGRÜN										
CAMPSIS RADICANS ROTE KLETTERTROMPETE	8-12		x		x											x	x	II	x			x	x	x		x	x	7.-9.	ORANGE-ROT			x							KLETTERHILFE BEIM ANWACHSEN SINNVOLL. BILDET VIELFACH NUR VERKÜMMERTE HAFTWURZELN.
CAMPSIS x TAGLIABUANA TROMPETENBLUME	4-5		x		x												x		x			x	x	x		x	x	7.-9.	ORANGE-ROT			x							
CELASTRUS ORBICULATUS BAUMWÜRGER, -MÖRDER	12	x						x				x	(x)		x			II	x	x						x		6.-7.	BLASSGRÜN		x			x		x			ZWEIHÄUSIG (→ ACTINIDIA). SEHR STARK SCHLINGEND. FRÜCHTE GIFTIG.